

## EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus parejas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

### Está asociado a:

- una **tasa de suicidios 3 veces más alta** que la media de la población y 7 veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una **ruptura de parejas en un 70%** de los casos, en el plazo de un año después del aborto.

- **2'6 veces más ingresos psiquiátricos** en los 90 días posteriores al aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una **mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media**, y 60% más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al **alcoholismo** (doble probabilidad) y al **abuso de drogas** (cinco veces más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un **aumento de la violencia doméstica** de un 500% y un aumento del maltrato infantil de un 1112%.

- un **alto riesgos de sufrir malformaciones** en embarazos posteriores, embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cerebrales, infartos... así como de **cáncer de mama**, de útero y de cérvix. También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender por qué el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España, seguido de los accidentes.

**Si necesitas ayuda** o sabes de alguien que la necesita, contáctanos por nuestra web. Ofrecemos terapia especializada, confidencial y gratuita... e información científica sobre el SPA. **[www.nomassilencio.com](http://www.nomassilencio.com)**

## EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus parejas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

### Está asociado a:

- una **tasa de suicidios 3 veces más alta** que la media de la población y 7 veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una **ruptura de parejas en un 70%** de los casos, en el plazo de un año después del aborto.

- **2'6 veces más ingresos psiquiátricos** en los 90 días posteriores al aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una **mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media**, y 60% más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al **alcoholismo** (doble probabilidad) y al **abuso de drogas** (cinco veces más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un **aumento de la violencia doméstica** de un 500% y un aumento del maltrato infantil de un 1112%.

- un **alto riesgos de sufrir malformaciones** en embarazos posteriores, embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cerebrales, infartos... así como de **cáncer de mama**, de útero y de cérvix. También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender por qué el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España, seguido de los accidentes.

**Si necesitas ayuda** o sabes de alguien que la necesita, contáctanos por nuestra web. Ofrecemos terapia especializada, confidencial y gratuita... e información científica sobre el SPA. **[www.nomassilencio.com](http://www.nomassilencio.com)**

## EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus parejas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

### Está asociado a:

- una **tasa de suicidios 3 veces más alta** que la media de la población y 7 veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una **ruptura de parejas en un 70%** de los casos, en el plazo de un año después del aborto.

- **2'6 veces más ingresos psiquiátricos** en los 90 días posteriores al aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una **mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media**, y 60% más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al **alcoholismo** (doble probabilidad) y al **abuso de drogas** (cinco veces más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un **aumento de la violencia doméstica** de un 500% y un aumento del maltrato infantil de un 1112%.

- un **alto riesgos de sufrir malformaciones** en embarazos posteriores, embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cerebrales, infartos... así como de **cáncer de mama**, de útero y de cérvix. También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender por qué el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España, seguido de los accidentes.

**Si necesitas ayuda** o sabes de alguien que la necesita, contáctanos por nuestra web. Ofrecemos terapia especializada, confidencial y gratuita... e información científica sobre el SPA. **[www.nomassilencio.com](http://www.nomassilencio.com)**

## EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus parejas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

### Está asociado a:

- una **tasa de suicidios 3 veces más alta** que la media de la población y 7 veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una **ruptura de parejas en un 70%** de los casos, en el plazo de un año después del aborto.

- **2'6 veces más ingresos psiquiátricos** en los 90 días posteriores al aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una **mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media**, y 60% más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al **alcoholismo** (doble probabilidad) y al **abuso de drogas** (cinco veces más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un **aumento de la violencia doméstica** de un 500% y un aumento del maltrato infantil de un 1112%.

- un **alto riesgos de sufrir malformaciones** en embarazos posteriores, embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cerebrales, infartos... así como de **cáncer de mama**, de útero y de cérvix. También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender por qué el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España, seguido de los accidentes.

**Si necesitas ayuda** o sabes de alguien que la necesita, contáctanos por nuestra web. Ofrecemos terapia especializada, confidencial y gratuita... e información científica sobre el SPA. **[www.nomassilencio.com](http://www.nomassilencio.com)**