

## ¿SABÍAS QUE...

...a las 6 semanas ya le late el corazón a un niño en gestación? ¿Y que se pueden registrar ya sus ondas cerebrales? ¿Y que a esta edad ya se empieza a mover?

**¿Que el niño siente el dolor a partir de las 8 semanas de gestación?** Los nervios sensitivos, entre ellos los nociceptores (nervios receptores de la sensación del dolor), aparecen en la piel del feto antes de la novena semana. La primera actividad nerviosa del cerebro fetal ocurre en el tálamo (centro del dolor) a los 2 meses de embarazo. Hacia el final de la 5ª semana, un ligero golpe en la boca del feto hace que los labios se retraigan, y a los 2 meses y medio de gestación se puede decir con certeza que su respuesta a los estímulos no es un reflejo.

Esto se comprobó en la ecografía realizada por una pro-abortista durante un aborto por aspiración practicado por el Dr. Nathanson, promotor del aborto legal en EE.UU. En ella se veía a una niña de 10 semanas de vida, que se movía activamente por el saco amniótico, a veces chupándose el pulgar. Su pulso era normal, de 120 pulsaciones por minuto. Cuando el primer instrumento del abortista tocó la pared uterina, la niña se replegó inmediatamente y su pulso se aceleró notablemente. El cuerpo de la niña no había sido tocado aún, pero ella ya sabía que algo había invadido su santuario.

La abortista que filmó el aborto describe lo que ocurrió después: *"Vimos con horror cómo maltrataban y descuartizaban a este pequeño e inocente ser humano. Primero la espina dorsal, luego las piernas, una tras otra. En medio de intensas convulsiones, la niña intentaba inútilmente huir del instrumento cortante. Con mis propios ojos la vi echar la cabeza hacia atrás y abrir la boca en un grito silencioso. En una parte de la ecografía, sus pulsaciones habían llegado a más de 200 por minuto, porque sentía terror."* Desde entonces, tanto la autora del vídeo como el Dr. Nathanson, se convirtieron en grandes defensores de la vida. Estas imágenes dan nombre al famoso vídeo titulado "EL GRITO SILENCIOSO", que puede verse en Internet.

**¿Sabías que el niño siente el dolor mucho más intensamente que el adulto?** Una serie de estudios han demostrado, no sólo que un bebé prematuro (o un feto) siente el dolor, sino que esa personita lo siente de una manera mucho más aguda que un adulto.

Si quieres saber más sobre esa "nada" (según algunos) que crece en el vientre de una madre, entra en nuestra web. **¿Sabías que ya ha habido más de un millón de abortos en España desde que se despenalizó este delito (que figura en el Código Penal)?**

¿Y que matar a otro no puede ser JAMÁS un derecho?

[www.unidosporlavida.org](http://www.unidosporlavida.org)

## ¿SABÍAS QUE...

...a las 6 semanas ya le late el corazón a un niño en gestación? ¿Y que se pueden registrar ya sus ondas cerebrales? ¿Y que a esta edad ya se empieza a mover?

**¿Que el niño siente el dolor a partir de las 8 semanas de gestación?** Los nervios sensitivos, entre ellos los nociceptores (nervios receptores de la sensación del dolor), aparecen en la piel del feto antes de la novena semana. La primera actividad nerviosa del cerebro fetal ocurre en el tálamo (centro del dolor) a los 2 meses de embarazo. Hacia el final de la 5ª semana, un ligero golpe en la boca del feto hace que los labios se retraigan, y a los 2 meses y medio de gestación se puede decir con certeza que su respuesta a los estímulos no es un reflejo.

Esto se comprobó en la ecografía realizada por una pro-abortista durante un aborto por aspiración practicado por el Dr. Nathanson, promotor del aborto legal en EE.UU. En ella se veía a una niña de 10 semanas de vida, que se movía activamente por el saco amniótico, a veces chupándose el pulgar. Su pulso era normal, de 120 pulsaciones por minuto. Cuando el primer instrumento del abortista tocó la pared uterina, la niña se replegó inmediatamente y su pulso se aceleró notablemente. El cuerpo de la niña no había sido tocado aún, pero ella ya sabía que algo había invadido su santuario.

La abortista que filmó el aborto describe lo que ocurrió después: *"Vimos con horror cómo maltrataban y descuartizaban a este pequeño e inocente ser humano. Primero la espina dorsal, luego las piernas, una tras otra. En medio de intensas convulsiones, la niña intentaba inútilmente huir del instrumento cortante. Con mis propios ojos la vi echar la cabeza hacia atrás y abrir la boca en un grito silencioso. En una parte de la ecografía, sus pulsaciones habían llegado a más de 200 por minuto, porque sentía terror."* Desde entonces, tanto la autora del vídeo como el Dr. Nathanson, se convirtieron en grandes defensores de la vida. Estas imágenes dan nombre al famoso vídeo titulado "EL GRITO SILENCIOSO", que puede verse en Internet.

**¿Sabías que el niño siente el dolor mucho más intensamente que el adulto?** Una serie de estudios han demostrado, no sólo que un bebé prematuro (o un feto) siente el dolor, sino que esa personita lo siente de una manera mucho más aguda que un adulto.

Si quieres saber más sobre esa "nada" (según algunos) que crece en el vientre de una madre, entra en nuestra web. **¿Sabías que ya ha habido más de un millón de abortos en España desde que se despenalizó este delito (que figura en el Código Penal)?**

¿Y que matar a otro no puede ser JAMÁS un derecho?

[www.unidosporlavida.org](http://www.unidosporlavida.org)

## ¿SABÍAS QUE...

...a las 6 semanas ya le late el corazón a un niño en gestación? ¿Y que se pueden registrar ya sus ondas cerebrales? ¿Y que a esta edad ya se empieza a mover?

**¿Que el niño siente el dolor a partir de las 8 semanas de gestación?** Los nervios sensitivos, entre ellos los nociceptores (nervios receptores de la sensación del dolor), aparecen en la piel del feto antes de la novena semana. La primera actividad nerviosa del cerebro fetal ocurre en el tálamo (centro del dolor) a los 2 meses de embarazo. Hacia el final de la 5ª semana, un ligero golpe en la boca del feto hace que los labios se retraigan, y a los 2 meses y medio de gestación se puede decir con certeza que su respuesta a los estímulos no es un reflejo.

Esto se comprobó en la ecografía realizada por una pro-abortista durante un aborto por aspiración practicado por el Dr. Nathanson, promotor del aborto legal en EE.UU. En ella se veía a una niña de 10 semanas de vida, que se movía activamente por el saco amniótico, a veces chupándose el pulgar. Su pulso era normal, de 120 pulsaciones por minuto. Cuando el primer instrumento del abortista tocó la pared uterina, la niña se replegó inmediatamente y su pulso se aceleró notablemente. El cuerpo de la niña no había sido tocado aún, pero ella ya sabía que algo había invadido su santuario.

La abortista que filmó el aborto describe lo que ocurrió después: *"Vimos con horror cómo maltrataban y descuartizaban a este pequeño e inocente ser humano. Primero la espina dorsal, luego las piernas, una tras otra. En medio de intensas convulsiones, la niña intentaba inútilmente huir del instrumento cortante. Con mis propios ojos la vi echar la cabeza hacia atrás y abrir la boca en un grito silencioso. En una parte de la ecografía, sus pulsaciones habían llegado a más de 200 por minuto, porque sentía terror."* Desde entonces, tanto la autora del vídeo como el Dr. Nathanson, se convirtieron en grandes defensores de la vida. Estas imágenes dan nombre al famoso vídeo titulado "EL GRITO SILENCIOSO", que puede verse en Internet.

**¿Sabías que el niño siente el dolor mucho más intensamente que el adulto?** Una serie de estudios han demostrado, no sólo que un bebé prematuro (o un feto) siente el dolor, sino que esa personita lo siente de una manera mucho más aguda que un adulto.

Si quieres saber más sobre esa "nada" (según algunos) que crece en el vientre de una madre, entra en nuestra web. **¿Sabías que ya ha habido más de un millón de abortos en España desde que se despenalizó este delito (que figura en el Código Penal)?**

¿Y que matar a otro no puede ser JAMÁS un derecho?

[www.unidosporlavida.org](http://www.unidosporlavida.org)

## ¿SABÍAS QUE...

...a las 6 semanas ya le late el corazón a un niño en gestación? ¿Y que se pueden registrar ya sus ondas cerebrales? ¿Y que a esta edad ya se empieza a mover?

**¿Que el niño siente el dolor a partir de las 8 semanas de gestación?** Los nervios sensitivos, entre ellos los nociceptores (nervios receptores de la sensación del dolor), aparecen en la piel del feto antes de la novena semana. La primera actividad nerviosa del cerebro fetal ocurre en el tálamo (centro del dolor) a los 2 meses de embarazo. Hacia el final de la 5ª semana, un ligero golpe en la boca del feto hace que los labios se retraigan, y a los 2 meses y medio de gestación se puede decir con certeza que su respuesta a los estímulos no es un reflejo.

Esto se comprobó en la ecografía realizada por una pro-abortista durante un aborto por aspiración practicado por el Dr. Nathanson, promotor del aborto legal en EE.UU. En ella se veía a una niña de 10 semanas de vida, que se movía activamente por el saco amniótico, a veces chupándose el pulgar. Su pulso era normal, de 120 pulsaciones por minuto. Cuando el primer instrumento del abortista tocó la pared uterina, la niña se replegó inmediatamente y su pulso se aceleró notablemente. El cuerpo de la niña no había sido tocado aún, pero ella ya sabía que algo había invadido su santuario.

La abortista que filmó el aborto describe lo que ocurrió después: *"Vimos con horror cómo maltrataban y descuartizaban a este pequeño e inocente ser humano. Primero la espina dorsal, luego las piernas, una tras otra. En medio de intensas convulsiones, la niña intentaba inútilmente huir del instrumento cortante. Con mis propios ojos la vi echar la cabeza hacia atrás y abrir la boca en un grito silencioso. En una parte de la ecografía, sus pulsaciones habían llegado a más de 200 por minuto, porque sentía terror."* Desde entonces, tanto la autora del vídeo como el Dr. Nathanson, se convirtieron en grandes defensores de la vida. Estas imágenes dan nombre al famoso vídeo titulado "EL GRITO SILENCIOSO", que puede verse en Internet.

**¿Sabías que el niño siente el dolor mucho más intensamente que el adulto?** Una serie de estudios han demostrado, no sólo que un bebé prematuro (o un feto) siente el dolor, sino que esa personita lo siente de una manera mucho más aguda que un adulto.

Si quieres saber más sobre esa "nada" (según algunos) que crece en el vientre de una madre, entra en nuestra web. **¿Sabías que ya ha habido más de un millón de abortos en España desde que se despenalizó este delito (que figura en el Código Penal)?**

¿Y que matar a otro no puede ser JAMÁS un derecho?

[www.unidosporlavida.org](http://www.unidosporlavida.org)

# EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus parejas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

Está asociado a:

- una **tasa de suicidios 3 veces más alta** que la media de la población y 7 veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una **ruptura de parejas en un 70%** de los casos, en el plazo de un año después del aborto.

- **2'6 veces más ingresos psiquiátricos** en los 90 días posteriores al aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una **mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media**, y 60% más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al **alcoholismo** (doble probabilidad) y al **abuso de drogas** (cinco veces más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un **aumento de la violencia doméstica** de un 500% y un aumento del maltrato infantil de un 1112%.

- un **alto riesgos de sufrir malformaciones** en embarazos posteriores, embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cerebrales, infartos... así como de **cáncer de mama**, de útero y de cérvix. También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender el enorme aumento en España de estas enfermedades y problemas sociales. **El aborto destruye a la mujer y a toda la sociedad.**

[www.nomassilencio.com](http://www.nomassilencio.com)

# EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus parejas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

Está asociado a:

- una **tasa de suicidios 3 veces más alta** que la media de la población y 7 veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una **ruptura de parejas en un 70%** de los casos, en el plazo de un año después del aborto.

- **2'6 veces más ingresos psiquiátricos** en los 90 días posteriores al aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una **mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media**, y 60% más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al **alcoholismo** (doble probabilidad) y al **abuso de drogas** (cinco veces más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un **aumento de la violencia doméstica** de un 500% y un aumento del maltrato infantil de un 1112%.

- un **alto riesgos de sufrir malformaciones** en embarazos posteriores, embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cerebrales, infartos... así como de **cáncer de mama**, de útero y de cérvix. También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender el enorme aumento en España de estas enfermedades y problemas sociales. **El aborto destruye a la mujer y a toda la sociedad.**

[www.nomassilencio.com](http://www.nomassilencio.com)

# EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus parejas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

Está asociado a:

- una **tasa de suicidios 3 veces más alta** que la media de la población y 7 veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una **ruptura de parejas en un 70%** de los casos, en el plazo de un año después del aborto.

- **2'6 veces más ingresos psiquiátricos** en los 90 días posteriores al aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una **mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media**, y 60% más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al **alcoholismo** (doble probabilidad) y al **abuso de drogas** (cinco veces más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un **aumento de la violencia doméstica** de un 500% y un aumento del maltrato infantil de un 1112%.

- un **alto riesgos de sufrir malformaciones** en embarazos posteriores, embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cerebrales, infartos... así como de **cáncer de mama**, de útero y de cérvix. También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender el enorme aumento en España de estas enfermedades y problemas sociales. **El aborto destruye a la mujer y a toda la sociedad.**

[www.nomassilencio.com](http://www.nomassilencio.com)

# EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus parejas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

Está asociado a:

- una **tasa de suicidios 3 veces más alta** que la media de la población y 7 veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una **ruptura de parejas en un 70%** de los casos, en el plazo de un año después del aborto.

- **2'6 veces más ingresos psiquiátricos** en los 90 días posteriores al aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una **mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media**, y 60% más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al **alcoholismo** (doble probabilidad) y al **abuso de drogas** (cinco veces más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un **aumento de la violencia doméstica** de un 500% y un aumento del maltrato infantil de un 1112%.

- un **alto riesgos de sufrir malformaciones** en embarazos posteriores, embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cerebrales, infartos... así como de **cáncer de mama**, de útero y de cérvix. También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender el enorme aumento en España de estas enfermedades y problemas sociales. **El aborto destruye a la mujer y a toda la sociedad.**

[www.nomassilencio.com](http://www.nomassilencio.com)